ANAMNESEBOGEN

Thrombophili	ie				
Name, Vorname des Versicherten	Geb. am				
	Datum der Blutentnahme	Praxisstempel			
	Datom der blutentnamme				
Ereignis					
Patient <u>ohne</u> thromboembolisch	nes Ereignis (Angaben zur Fan	nilienanamnese auf de	r Rückseite erforderlic	h)	
Patient <u>mit</u> gesichertem thromb	ooembolischem Ereignis (tie	efe Beinvenenthrombo	se, Lungenembolie, aty	/pische Thrombose)	
_	<u> </u>			idiopathisch	
2. Ereignis Zeitpunkt:	Risikofaktoren: idiopathisch			_	
3. Ereignis Zeitpunkt:	Risikofakto	Risikofaktoren: idiopathisch			
Risikofaktoren: Hormontherapie (H), Schwangerschaft (S), Wochenbett (W), Immobilisation (I), Adipositas (A), Malignom (M), Operation (O), Flugreise (F), Nikotinabusus (N)					
Lokalisation der Thrombose		1. Ereignis	2. Ereignis	3. Ereignis	
Lungenembolie					
Tiefe Beinvenenthrombose Unterschenkel					
Tiefe Beinvenenthrombose Oberschenkel (mit V. poplitea)					
Sinusvenenthrombose					
Mesenterial-/Pfortaderthrombose					
Armvenenthrombose oder Thrombose in V. subclavia					
Muskelvenenthrombose					
Andere Lokalisation:					
Residuen nachgewiesen					
Patient mit <u>anderem</u> Ereignis					
Abortneigung (> 2 Aborte)			SSWs.		
Schwangerschaftskomplikatio					
Zentralvenenthrombose (Aug	Zeitpunkt:				
☐ Thrombophlebitis	Zeitpunkt:				
☐ Arterielles Ereignis	Zeitpunkt:				
	PAVK				
Sonstiges:					





Medikation

Aktuelle Antikoagulation	Letzte Gabe vor Blutentnahme in h	Dosis				
☐ Dabigatran (Pradaxa®)						
☐ Rivaroxaban (Xarelto®)						
☐ Apixaban (Eliquis®)						
☐ Edoxaban (Lixiana®)						
☐ Vitamin-K-Antagonisten (z.B. Marcumar®, Falithron	m®)					
☐ Niedermolekulares Heparin						
Fondaparinux (Arixtra®)						
Aktuelle antithrombozytäre Medikation						
☐ Acetylsalicylsäure ☐ Andere:						
Andere Medikation:						
Familienanamnese						
☐ Verwandte ersten Grades mit thromboembolisch	nem Ereignis					
☐ Ein Verwandter ☐ Mehrere	Verwandte					
☐ Weitere Verwandte mit thromboembolischem Er	☐ Weitere Verwandte mit thromboembolischem Ereignis					
☐ Ein Verwandter ☐ Mehrere	Verwandte					
Vorbefunde aus Thrombophiliediagnostik in der Familie bekannt:						
Bemerkungen						

